UNIVERSITÄTS KLINIKUM HEIDELBERG

Falls ohne Aufdruck/(Etikett) handschriftliche Angaben!
Name, Vorname, Geburts-Datum, Geschlecht, Klinik, Station/Arztpraxis

◯ Regelleistung ◯ Wahlleistg. Arzt Adr. Privat-Patient/Selbstzahler

UniversitätsKlinikum Heidelberg
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 305
Postfach 10 30 60
69120 Heidelberg
Institut für Immunologie, Prof. Dr. S. Meuer

Datum der Probenentnahme

Uhrzeit der Probenentnahme

Auftrag Allgemeine Immunologie

Telefon Fax-Nr.

Namenstempel bei Ambulanzarzt/Arztpraxis
Unterschrift und Richtigkeit der Probenentnahme
(zwingend erforderlich !)
Befundadresse/Rechnungsadresse:

Wichtig: Klinische Diagnose/Fragestellung/Therapie

Therapie mit C5 Inhibitor: Eculizumab (Soliris®) ◯ ja ◯ nein Ravulizumab (Ultomiris®) ◯ ja ◯ nein

aktuelle C3 Konzentration ________ g/l

Labor für Komplementdiagnostik (Dr. med. Jutta Schröder-Braunstein), Im Neuenheimer Feld 305, Raum 220, 69120 Heidelberg (Lieferadresse), Rohrpost-Nr. 3051 (nur intern)

Komplement-Diagnostik

(Rückfrage: 06221-5640 26/15, Information www. klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostik.143295.0.html)

Material: ◯ Serum ◯ EDTA-Plasma

gekühlt transportieren oder spätestens nach 1 Std. Serum und Plasma (vom Blutkuchen getrennt) in unbeschichteten Röhrchen tiefgefrieren.
Einsendung von Serum und Plasma. Probenversand bitte auf Trockeneis!

◯ Komplement-Status: beinhaltet Gesamt-C-Funktion klassischer Weg/CH50 (Serum), alternativer Weg/APH50 (Serum), C3d (EDTA-Plasma), sC5b-9 (**nur** EDTA-Plasma) (empfohlen zur Eingangsuntersuchung und Verlaufskontrolle)

◯ Einzelparameter als Protein: ◯ C1q ◯ C3 ◯ C4 ◯ C3d ◯ Faktor B ◯ Faktor D ◯ Faktor H ◯ Faktor I ◯ Properdin ◯ MBL (Mannose bind. Lektin)

◯ Einzelparameter als Funktion: ◯ klass. Weg (CH 50) ◯ altern. Weg (APH50) ◯ Lektinweg (Funktion)

◯ Einzelfaktoren C1-C9 (nur nach tel. Rücksprache)

◯ sC5b-9 (nur in EDTA-Plasma)

◯ Autoantikörper: ◯ C3-Nephritis-Faktor (nur im Serum) ◯ Auto-anti-Faktor H ◯ Auto-anti-C1q ◯ Auto-anti-C1 Inhibitor

◯ weitere Spezialtests ……......................…...................... (nur nach tel. Rücksprache)

◯ C5 Inhibitor Monitoring: ◯ Hemmwirkung: beinhaltet CH50, APH50, C3d, sC5b-9
◯ Serumkonzentration: ◯ Eculizumab ® ◯ Ravulizumab ®

Labor für Molekulare Immundiagnostik (Prof. Dr. med. Thomas Giese), Im Neuenheimer Feld 305, Raum 420, 69120 Heidelberg (Lieferadresse), Rohrpost-Nr. 3051

Molekulare Immundiagnostik

(nach tel. Anmeldung : 06221-564012/24)

Material: ◯ Vollblut (Heparin)

Untersuchung: ◯ NFAT-Inhibition ◯ Genexpression spontan
Genexpression induziert ◯ Diagn. Durchflusszytometrie

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13060-04-00

INST. 911.07.05.18

Allgemeine Immunologie

RIECO (06359) 9340-0