Lidocain-HCl 0,2%
in Glandomed 500g

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Lidocain-HCl x H_2O	1,0 g	Fagron, Caelo, EuroOTC etc.
Glandomed	499,0 g	STADA

benötigte Geräte: Becherglas, Waage

Herstellung

1. Lidocain-HCl in ein ausreichend großes Becherglas einwiegen.
2. Glandomed-Mundspüllösung dazu wiegen.
3. Mit einem Glasstab rühren bis das Pulver vollständig gelöst ist.
4. Die fertige Lösung abfüllen und etikettieren.

Organoleptische Prüfung:

Es entsteht eine klare Lösung, die keine ungelösten Pulver-Reste mehr enthält.

Anwendungshinweis: Mit ca. 15 Millilitern (ein Esslöffel) der Lösung soll zwei Minuten gespült werden. Anschließend wird die Lösung wieder ausgespuckt, nicht getrunken.

Haltbarkeit: 1 Monat bei Raumtemperatur

Packmittel: PET-Flasche oder Glasflasche

Quellen:
Die Rezeptur ist in Anlehnung an eine Vorschrift auf der Homepage: www.mucositis.de erstellt worden (abgerufen am 12.02.2014). Dort veröffentlicht sind auch Stabilitätsuntersuchungen und Hintergründe zu der Therapie der Mucositis.

letzte Aktualisierung: 17.02.2026, Hoschke