Metoprololtartrat
Lösung 10 mg/ml

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Metoprololtartrat	1 g	Fagron
Kaliumsorbat	0,14 g	Fagron, Caelo, EuroOTC etc.
Citronensäure, wasserfrei	0,07 g	Fagron, Caelo, EuroOTC etc.
Gereinigtes Wasser	98,79 g	Fertigprodukt

Hinweis: Achtung Metoprololtartrat ist bitter!

benötigte Geräte: Analysenwaage, Becherglas, Glasstab

Herstellung:

1. Kaliumsorbat abwiegen und in etwa 80% des benötigten Wassers in einem Becherglas lösen.
2. Metoprololtartrat abwiegen, dem Ansatz hinzufügen und lösen.
3. Citronensäure abwiegen und zum Ansatz geben.
4. Mit gereinigtem Wasser bis zur Endmenge auffüllen.

Organoleptische Prüfung:

Es entsteht eine klare, farblose Lösung.

Haltbarkeit: 6 Monate bei Raumtemperatur + Lichtschutz

Packmittel: PET-Flasche – evtl. Zugabe von Oralspritzen oder Kolbenpipette

Quellen: NRF Rezepturenfinder
letzte Aktualisierung: 09.06.2026, Hoschke