Mischsalbe 25% 100g

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Betamethasonvalerat	0,03g	Fagron, Caelo
Dickflüssiges Paraffin	3,75g	Fagron, Caelo
Milchsäure 90%	0,75g	Fagron, Caelo
Wollwachs	7,50g	Fagron, Caelo
Glycerol 85%	11,00g	Fagron, Caelo
Weißes Vaselin	21,50g	Fagron, Caelo
Unguentum Cordes	40,50g	Ichthyol
Gereinigtes Wasser	14,975g	Fertigprodukt

Hinweis: Anwendung zum Ausschleichen der Betamethason-Therapie (Normkonzentration eigentlich zu gering)

Benötigte Geräte: Fantaschale mit Pistill, Wasserbad

Herstellung:

1. Wollwachs, Vaselin und Unguentum Cordes zusammen auf dem Wasserbad schmelzen.
2. Wasser, Milchsäure und Glycerol mit annähernd gleicher Temperatur einarbeiten. Ggf. verdunstetes Wasser ergänzen.
3. Betamethasonvalerat mit Paraffin anreiben und in die hergestellte Grundlage homogen einarbeiten.

Organoleptische Prüfung: Es entsteht eine gelbliche Salbe.

Haltbarkeit: 6 Monate
Packmittel: Tube oder Kruke

Quellen: langjährige Vorschrift am Universitätsklinikum Heidelberg, die Grundlage ist in Anlehnung an eine Empfehlung der Ichthyol-Gesellschaft für wirkstofffreie Rezepturen erstellt worden
letzte Aktualisierung: 04.02.2026, Hoschke