Mischsalbe 50% 100g

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Betamethasonvalerat	0,061 g	Fagron, Caelo
Dickflüssiges Paraffin	7,5 g	Fagron, Caelo
Milchsäure 90%	0,44 g	Fagron, Caelo
Wollwachs	5,0 g	Fagron, Caelo
Glycerol 85%	7,5 g	Fagron, Caelo
Weißes Vaselin	42,5 g	Fagron, Caelo
Unguentum Cordes	27,0 g	Ichthyol
Gereinigtes Wasser	10,0 g	Fertigprodukt

Hinweis: Anwendung zum Ausschleichen der Betamethason-Therapie

Benötigte Geräte: Fantaschale mit Pistill, Wasserbad

Herstellung:

1. Wollwachs, Vaselin und Unguentum Cordes zusammen auf dem Wasserbad schmelzen.
2. Wasser, Milchsäure und Glycerin mit annähernd gleicher Temperatur einarbeiten. Ggf. verdunstetes Wasser ergänzen.
3. Betamethasonvalerat mit Paraffin anreiben und in die hergestellte Grundlage homogen einarbeiten.

Organoleptische Prüfung: Es entsteht eine gelbliche Salbe

Haltbarkeit: 6 Monate
Packmittel: Tube oder Kruke

Quellen: langjährige Vorschrift am Universitätsklinikum Heidelberg, die Grundlage ist in Anlehnung an eine Empfehlung der Ichthyol-Gesellschaft für wirkstofffreie Rezepturen erstellt worden.
letzte Aktualisierung: 04.02.2026, Hoschke